

ฉลากยาเสริมสำหรับ...ไกลเบนคลาไมด์/กลีบพีไซต์

- ❶ ยานี้ เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด **ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ** ซึ่งหากแก้ไขไม่ทันอาจมีความพิการทางสมองหรือเสียชีวิตได้
- ❷ ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด **ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง**
- ❸ การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
- ❹ **ตัวอย่างอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ** ได้แก่ รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวาน และรีบไปโรงพยาบาล